



INDICAÇÃO DE USO:

Aditivo probiótico indicado para bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos. Contribui para o equilíbrio da microbiota ruminal e intestinal. "Uso exclusivo na alimentação animal".

INDICACIÓN DE USO:

Aditivo probiótico indicado para bovinos, búfalos, ovinos y caprinos. Contribuye para el equilibrio de la microbiota rumal y intestinal. "Uso exclusivo en alimentación animal".

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO:

Bacillus subtilis (CCT 0089), Bifidobacterium bifidum (DSM 20456), Enterococcus faecium (CCT 6646), Lactobacillus acidophilus (CCT 2949), Lactobacillus buchneri (CCT 3746), Lactobacillus casei (CCT 1465), Lactobacillus lactis (CCT 1344), Saccharomyces cerevisiae (CCTCC M207177 / NCYC 996), soro de leite em pó, levedura seca de cana-de-açúcar, sulfato de ferro e veículo.

COMPOSICIÓN BÁSICA DEL PRODUCTO:

Bacillus subtilis (CCT 0089), Bifidobacterium bifidum (DSM 20456), Enterococcus faecium (CCT 6646), Lactobacillus acidophilus (CCT 2949), Lactobacillus buchneri (CCT 3746), Lactobacillus casei (CCT 1465), Lactobacillus lactis (CCT 1344), Saccharomyces cerevisiae (CCTCC M207177 / NCYC 996), suero de leche en polvo, levadura seca de caña de azúcar, sulfato de hierro y vehículo.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO:
NIVELES DE GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Bacillus subtilis (mínimo)	3,00 x 10 ⁹ UFC/g
Bifidobacterium bifidum (mínimo)	1,00 x 10 ⁹ UFC/g
Enterococcus faecium (mínimo)	1,00 x 10 ⁹ UFC/g
Lactobacillus acidophilus (mínimo)	1,00 x 10 ⁹ UFC/g
Lactobacillus buchneri (mínimo)	2,00 x 10 ⁹ UFC/g
Lactobacillus casei (mínimo)	1,00 x 10 ⁹ UFC/g
Lactobacillus lactis (mínimo)	1,00 x 10 ⁹ UFC/g
Saccharomyces cerevisiae (mínimo)	2,00 x 10 ⁸ UFC/g

MODO DE USAR:

Adicionar às rações, concentrados ou suplementos minerais em quantidade suficiente para garantir os seguintes níveis de consumo diário:

Bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos: Bezerros e cordeiros (as):	0,3 a 1,0 g p/ cada 100 kg peso vivo*
Bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos a campo:	0,2 a 1,0 g p/ cada 100 kg peso vivo*
Bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos semi-confinados / confinados:	0,5 a 2 g p/ cada 100 kg peso vivo*
Vacas, búfalas, ovelhas e cabras em lactação:	0,5 a 2 g p/ cada 100 kg peso vivo*

FORMA DE USAR:

Adicionar a las raciones, concentrados o suplementos minerales en cantidad suficiente para garantizar los siguientes niveles de consumo diario:

ADITIVO PROBIÓTICO PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL
ADITIVO PROBIÓTICO PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL



BOVINOS



BUBALINOS



OVINOS



CAPRINOS

Bovinos, búfalos, oveja y cabras: Becerros y corderos (as):	0,3 a 1,0 g p/ cada 100 kg peso vivo*
Bovinos, búfalos, oveja y cabras a campo:	0,2 a 1,0 g p/ cada 100 kg peso vivo*
Bovinos, búfalos, oveja y cabras semi-confinados o confinados:	0,5 a 2 g p/ cada 100 kg peso vivo*
Vacas, búfalas, ovelhas y cabras en lactacion:	0,5 a 2 g p/ cada 100 kg peso vivo*

*o conforme orientación técnica.

MODO DE CONSERVAR:

Conservar o produto em embalagem sempre fechada, em local coberto, fresco, seco, protegido da luz solar direta, sobre estrados e afastado de paredes e produtos tóxicos.

FORMA DE CONSERVAR:

Conservar el producto en embalaje siempre cerrado, en local cubierto, fresco, seco, protegido de la luz solar directa, sobre tarimas y apartado de paredes y productos tóxicos.

PRODUTO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO SOB Nº SP – 003931-4.000024

*Produzido / Embalado / Comercializado segundo o sistema certificado nº 100/17-1.
**Insuno aprovado para uso como aditivo na alimentação animal de acordo com as normas NOP-EUA, COR/CANADA, IBD/IFOAM, CEE 889/08, DEMETER e Lei Brasileira No 10.831/2003.

