



## Conejos Gazapos y Madres

El éxito de la cría de conejos depende, en gran parte, de la alimentación que se les suministre. Más aún, si se los somete a una explotación intensiva con destete precoz, 6 partos por año y sacrificio temprano (9 semanas).

Todas las funciones orgánicas del conejo, especialmente las funciones complejas del aparato reproductor, están íntimamente relacionadas entre sí, e influenciadas por los principios nutritivos contenidos en la alimentación.

Además, su capacidad de reproducción, así como su precocidad, exigen una dieta muy equilibrada para poder desarrollar al máximo sus aptitudes productivas, que se estiman en 30 descendientes viables por madre y por año, que a su vez deben alcanzar como mínimo en 9 semanas, 30 veces el peso de nacimiento.



## Administración

### Reproductores:

**Machos:** 100 a 120 gr. por día

**Hembras:** Es imprescindible evitar el engorde, ya que sería muy perjudicial para la fertilidad.

**Gestación:** se administran 30 gr. por kilo de peso vivo, hasta el momento en que la gestación es reconocible a simple vista. Luego, debe implementarse un racionamiento a voluntad y adaptarlo al término de la lactación precedente.

**Lactación:** alimento a voluntad.

Para las hembras en descanso y futuras madres jóvenes antes del servicio: 60 a 80 gr. por día son suficientes para mantenerlas en buen estado para un futuro acoplamiento.

## Gazapos Destete

Alimento especialmente desarrollado para alimentar a los gazapos a partir del destete (35 días) y hasta los 49 días de edad.

Su composición está seleccionada para evitar las diarreas relacionadas con la mala digestión del almidón y la fermentación intestinal que se produce en el momento del destete cuando el gazapo pasa a depender exclusivamente de la ingestión de alimento sólido.

El consumo es a voluntad sin necesidad de suplemento de forraje adicional. A partir de los 50 días de edad continuar con el suministro de Conejo Engorde Aliba.

## Conejo Engorde Aliba

Para lograr un engorde óptimo, se recomienda administrar alimento balanceado a voluntad. Se aconseja en todos los casos suministrar la cantidad de alimento necesario sólo para el día. Además, los conejos deben disponer de agua limpia y fresca en forma permanente.

Una semana antes del sacrificio suministrar el alimento Conejos Última Semana hasta la fecha de faena.

Datos analíticos (en %)				
	Proteínas	Fibra	Calcio	Fósforo
Gazapos Destete	17,5	12,5	1,10	0,70
Gazapos y Madres	17	13	1,10	0,60
Conejos Engorde	15	13,5	0,95	0,60

## Conejos Última Semana

Para evitar residuos de anticoccidiano en la carcasa eviscerada del conejo para consumo, este alimento debe sustituir a Conejos Engorde Aliba siete (7) días antes del sacrificio. El consumo es a voluntad.