



PROCAPS®



B-Vit HT®

VITAMINAS B₁₂, B₆, B₁ + LIDOCAÍNA

B-Vit HT®
VITAMINAS B₁₂, B₆, B₁ + LIDOCAÍNA

3

JERINGAS PRELLENADAS de 2 mL
SOLUCIÓN INYECTABLE
+ AGUJAS DESCHABLES





Betaduo 1ml
SUSPENSION INYECTABLE - 1 UNIDAD
JERINGA PRELLENGA

SUSPENSION INYECTABLE - 1 UNIDAD

Betaduo[®] 2 ml

10 mg/2 ml povidone - 1 mg/2 ml clorhexidina

JERINGA PRELLENADA

SUSPENSIÓN INYECTABLE - 1 UNIDAD



Betaduo[®] 2 ml
JERINGA PRELLENADA



FortZink®

Sulfato de Zinc

20 mg

20
CÁPSULAS BLANDAS



FortZink
Sulfato de Zinc

20 mg / 5mL
Jarabe

CONTIENE JERINGA
DOSIFICADORA

120 mL

Sabor a Vainilla





FortZink
Sulfato de Zinc

10 mg/mL
Gotas

30 mL
SOLUCIÓN
ORAL

Sabor a Vainilla



MEDICAMENTO ESENCIAL EN COLOMBIA

Kimod[®] 3 mg
ivermectina PROCAPS

PROCAPS

Kimod[®] 3 mg
ivermectina

7
Cápsulas Blandas

PROCAPS

Kimod[®] 3 mg
ivermectina

SABOR
NEUTRO

 Nutrigel^{2.0}[®]

COLÁGENO HIDROLIZADO 100%

30

STICK PACK

10,4 G PÓLVO POR STICKPACK



Nutrigel^{2.0}[®]

COLÁGENO HIDROLIZADO 100%
SABOR NEUTRO

10,4 G PÓLVO POR STICKPACK
30 STICKPACKS
AL COLÁGENO HIDROLIZADO 100%
SE LE AGREGA VITAMINA C E
ACIDOS AMINOS PARA MEJORAR LA
ABSORCIÓN DEL COLÁGENO EN EL
ORGANISMO.
INDICACIONES: PARA EL CUIDADO DE LA
PIEL Y LAS ARTICULACIONES.
CONTRA EL ENVEJECIMIENTO PRECOZ.
PROTECTOR DE LA SALUD.

Procap, S.A.



Nutrigel
ADVANCE

SABOR
NEUTRO

Nutrigel

COLÁGENO HIDROLIZADO 100% + VITAMINA C + VITAMINA D3

ADVANCE

**COLÁGENO HIDROLIZADO 100%
CON VITAMINA C + VITAMINA D3**

30
STICK PACK

SEAL DE COLÁGENO POR STICK PACK
VITAMINA C 2.000 MG
VITAMINA D3 500 UI





Nutrigel

COLÁGENO HIDROLIZADO + VITAMINA C + VITAMINA D3

ADVANCE

**COLÁGENO HIDROLIZADO 100%
CON VITAMINA C + VITAMINA D3**

30
CAPSULAS

100% DE COLÁGENO POR CAPSULA
VITAMINA C 1000 mg
VITAMINA D3 1000 IU



SABOR
MANDARINA

Nutrigel
ADVANCE

CONTEÚDO: 30 CAPSULAS (30 DIAS)
SABOR: MANDARINA

INDICAÇÃO: SUPLENTE NUTRICIONAL

USO: 1 CAPSULA 1 VEZ AO DIA, COM O ALMOÇO

CONDIÇÕES DE USO: 1 CAPSULA 1 VEZ AO DIA, COM O ALMOÇO

CONDIÇÕES DE USO: 1 CAPSULA 1 VEZ AO DIA, COM O ALMOÇO

CONDIÇÕES DE USO: 1 CAPSULA 1 VEZ AO DIA, COM O ALMOÇO

CONDIÇÕES DE USO: 1 CAPSULA 1 VEZ AO DIA, COM O ALMOÇO

CONDIÇÕES DE USO: 1 CAPSULA 1 VEZ AO DIA, COM O ALMOÇO

CONDIÇÕES DE USO: 1 CAPSULA 1 VEZ AO DIA, COM O ALMOÇO

CONDIÇÕES DE USO: 1 CAPSULA 1 VEZ AO DIA, COM O ALMOÇO

CONDIÇÕES DE USO: 1 CAPSULA 1 VEZ AO DIA, COM O ALMOÇO

CONDIÇÕES DE USO: 1 CAPSULA 1 VEZ AO DIA, COM O ALMOÇO

CONDIÇÕES DE USO: 1 CAPSULA 1 VEZ AO DIA, COM O ALMOÇO

CONDIÇÕES DE USO: 1 CAPSULA 1 VEZ AO DIA, COM O ALMOÇO

CONDIÇÕES DE USO: 1 CAPSULA 1 VEZ AO DIA, COM O ALMOÇO



Nytax[®]

NITAZOXANIDA 500 mg



6
CÁPSULAS BLANDAS









VITAMINAS Y MINERALES

[illegible]

120 mL
JALEA



VITAMINAS Y MINERALES

120 mL
2M FA



Vitybell

Vitybell®

Biotina + Ácido Pantoténico + Nicotinamida + Zinc
+ Cobre + Selenio + Riboflavina + Piridoxina

SUPLEMENTO DIETARIO
30 cápsulas blandas



21 Tabletas Recubiertas
G-tabs®



Adella®
CLORMADINONA ACETATO 2 mg
ETINILESTRADIOL 0,03 mg

28 Tabletas Recubiertas
G-tabs®



Adella. mini
GLORMADINONA ACETATO 2 mg
ETNILESTRADIOL 0,02 mg





30 Tabletas Recubiertas



Citrangel®
Citrato de Calcio 1500 mg
+ Vitamina D₃ 200 U

Citrangel®

CITRATO DE CALCIO 1500 mg
+ VITAMINA D₃ 200 U



Citraquel
CITRATO DE CALCIO 1500 mg
+ VITAMINA D₃ 200 UI

Citraquel
CITRATO DE CALCIO 1500 mg
+ VITAMINA D₃ 200 UI

90 Tablet Recubiertas

30 Cápsulas blandas
de gelatina



Deferol®
Vitamina D3 2000 U.I.

60 Cápsulas blandas
de gelatina



Deferol[®]
Vitamina D3 2000 U.I.

4 Cápsulas blandas
de gelatina



Deferol[®]
Vitamina D3 7000 U.I.

8 Cápsulas blandas
de gelatina



Deferol[®]

Vitamina D3 7000 U.I.

16 Cápsulas blandas
de gelatina



Deferol[®]
Vitamina D3 7000 U.I

30

Cápsulas
revestidas

Ezolium
Esomeprazol 40mg

20mg



MEDICAMENTO ESENCIAL EN COLOMBIA

90

Cápsulas
recubiertas

Ezolium
Esomeprazol 40mg

20mg



MEDICAMENTO ESENCIAL EN COLOMBIA

30

Cápsulas
recubiertas

Ezolium

Esomeprazol 40mg

40mg



MEDICAMENTO ESENCIAL EN COLOMBIA

90

Cápsulas
recubiertas

Ezolium
Esomeprazol 40mg

40mg



MEDICAMENTO ESENCIAL EN COLOMBIA

GESTAVIT® DHA
VITAMINAS Y MINERALES CON DHA
PARA EL EMBARAZO

GESTAVIT® DHA

VITAMINAS Y MINERALES CON DHA
PARA EL EMBARAZO

Sin Olor
Sin Sabor

con

Cubierta Entérica

30

CAPSULAS
BLANCAS
DE COLITINA

Nuevo
Imagen

Ifaxim®
RIFAXIMINA 550 mg

Ifaxim®
RIFAXIMINA 550 mg

14
CÁPSULAS BLANDAS

GRUPO
PROCAPS

Nueva
Imagen

Ifaxim®

RIFAXIMINA 550 mg

28
CÁPSULAS BLANDAS

GRUPO
PROCAPS



[illegible]

Healthcare

Ifaxim®
RUFAXIMINA 100 mg/5 mL
POLVO PARA
SUSPENSIÓN ORAL

SABOR A NARANJA TROPICAL

60 mL
SUSPENSION
RECONSTITUIDA



21 Tabletas Recubiertas
G-tabs®



Istela®

CIPROTERONA ACETATO 2 mg
ETINILESTRADIOL 0,035 mg

21 Tabletas Recubiertas
G-tabs®



Yael®
DIENOGEST 2 mg
ETINILESTRADIOL 0,03 mg





30 Cápsulas Blandas Twist off



Jarrit®

Jarrit®
PROGESTERONA 25 mg

LIPOMEGA 10^{mg}

Suplemento dietético de gelatina con forma de
blanda de gelatina. Cada blanda contiene 465 mg de
Ácido Eicosapentaenoico (EPA) y 375 mg de Ácido
Docosahexaenoico (DHA) + Atorvastatina 10 mg.

Indicado en personas con problemas de colesterol, triglicéridos y/o diabetes, así como en personas con problemas de salud cardiovascular. Se recomienda su uso en personas con problemas de salud cardiovascular. Se recomienda su uso en personas con problemas de salud cardiovascular. Se recomienda su uso en personas con problemas de salud cardiovascular.

Se recomienda su uso en personas con problemas de salud cardiovascular. Se recomienda su uso en personas con problemas de salud cardiovascular. Se recomienda su uso en personas con problemas de salud cardiovascular.

LIPOMEGA[®] 10^{mg}

465 mg de Ácido Eicosapentaenoico
375 mg de Ácido Docosahexaenoico + Atorvastatina 10 mg

120 Cápsulas

Blandas de gelatina
con forma de dosificación unigel



LIPOMEGA® 20^{mg}

COMPOSICIÓN
Cada una de las 30 cápsulas contiene:
- 20 mg de Atorvastatina (20 mg de sales)
- 840 mg de Omega 3 (EPA + DHA) + co-solvente 20 mg.
Excipientes: glicerilo estearato, etanol.

USO Y ADMINISTRACIÓN: ver.

PRECAUCIONES: ver el prospecto.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: hipersensibilidad a la atorvastatina, a los
ácidos grasos o cualquier uno de los componentes del producto. Embarazo.

PRECAUCIONES: no se recomienda el uso de atorvastatina en niños menores de
16 años. Se debe tener en cuenta la presencia de anomalías cardíacas antes de iniciar el
tratamiento.

**Se debe precaución en la administración de atorvastatina en pacientes con insuficiencia
cardíaca o en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.**



7 700153 038034

LIPOMEGA®
Atorvastatina 20 mg + Omega 3 840 mg **20^{mg}**

30

Cápsulas

Blandas de gelatina
con forma de dosificación unigel



LIPOMEGA[®] PS 20^{mg}

Atorvastatina 20 mg + Omega 3 840 mg

60 Cápsulas

Blandas de gelatina
con forma de dosificación unigel



LIPOMEGA[®] PS 20^{mg}

Elaborado por Procaps S.A. Barranquilla, Colombia
Director Técnico: Dr. Alberto De La Haza Duenas O.E. II. de C.
Colombia: Registro Sanitario No. INVIMA 2015-M-0019302
Importado y Comercializado en Bolivia por Promedical S.A.
Bolivia: Reg. San. No.
Importado y Comercializado por Roddome Pharmaceuticals S.A. (Cuba - Ecuador)
Ecuador: Reg. San. No.
CUM: Ecuador
El Salvador inscrito en la DIMM bajo el No.
Guatemala: Reg. San. No.
Panamá: Reg. San. No.
Importado por UNIMED DEL PERU S.A.
Calle Los Libertadores 155, Pisos 6 y 7, San Isidro, Lima - Perú.
R.U.C. 20253788119, Director Técnico: O.E. Rosal Reyes, Perú: Reg. San. No.
Distribuido en República Dominicana por Sigmar Dominicana S.C.
República Dominicana: Reg. San. No.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ALMACENAR A TEMPERATURA MENOR DE 30°C
EN SU EMPAQUE ORIGINAL.

Muvett[®] *inyectable*
TRIMEBUTINA MALEATO 50 mg/5 mL

PROCAPS 

Nueva
Imagen

Muvett[®] *inyectable*
TRIMEBUTINA MALEATO 50 mg/5 mL

2
AMPOLLAS de 5 mL
SOLUCIÓN INYECTABLE

GRUPO
PROCAPS 

Muvett®
TRIMEBUTINA MALEATO 200 mg

Nova
Imagem

Muvett®
TRIMEBUTINA MALEATO 200 mg

21
CÁPSULAS DURAS

GRUPO
PROCAPS

Muvett®
TRIMEBUTINA MALEATO 200 mg





Muvett[®]
300 mg

PROCAPS

Nueva
imagen

Muvett[®]
300 mg

Muvett[®]
TRIMEBUTINA MALEATO 300 mg

20
TABLETAS DE LIBERACIÓN
PROLONGADA

PROCAPS



Muvett Flora®
Trimebutina 300 mg
contiene fibra propia



Indicaciones: el medicamento se usa en el tratamiento de los síntomas de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa, así como en el tratamiento de la constipación.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a la Trimebutina o a cualquiera de los componentes del medicamento. No se recomienda su uso en pacientes con antecedentes de úlcera gástrica o duodenal, o con antecedentes de sangrado gastrointestinal.

Precauciones: no se recomienda su uso en pacientes con antecedentes de úlcera gástrica o duodenal, o con antecedentes de sangrado gastrointestinal.



7 115815 004723

PROCAPS

Indicaciones: el medicamento se usa en el tratamiento de los síntomas de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa, así como en el tratamiento de la constipación.

Muvett Flora®
Trimebutina 300 mg
contiene fibra propia

Sabor
NARANJA

SABOR A

NARANJA

Muvett Flora®
TRIMEBUTINA 300 mg

CONTIENE FIBRA (FOS)

30
STOCKPACK 12 g en POLVO
PARA SUSPENSIÓN ORAL

PROCAPS

Muvett S[®]
TRIMEBUTINA MALEATO 200 mg
SIMETICONA 120 mg

PROCAPS

Nueva
Imagen

Muvett S[®]
TRIMEBUTINA MALEATO 200 mg
SIMETICONA 120 mg

21
TABLETAS RECUBIERTAS

GRUPO
PROCAPS

Muvett S[®]
TRIMEBUTINA MALEATO 200 mg
SIMETICONA 120 mg



Pleniv®

CÁPSULA BLANDA
DE GELATINA CON
CUBIERTA ENTERICA

COLIMVASILICATO 10 mg + PROCINACLORIDATO 10 mg

30

CÁPSULAS BLANDAS
DE GELATINA CON
CUBIERTA ENTERICA



Pleniv®
CÁPSULA BLANDA
DE GELATINA CON
CUBIERTA ENTERICA
COLIMVASILICATO 10 mg + PROCINACLORIDATO 10 mg

Pleniv®

CÁPSULA BLANCA
DE GELATINA CON
CUBIERTA ENTERICA

DOLAMINACLOTRATO 10mg + PREDNISONA 10mg

60

60 CÁPSULAS
BLANCAS DE GELATINA
CON CUBIERTA ENTERICA



Pleniv®
CÁPSULA BLANCA DE GELATINA CON CUBIERTA ENTERICA
DOLAMINACLOTRATO 10mg + PREDNISONA 10mg

Vaxiduo[®] +vaxiduo[®]
CLINDAMICINA 100 mg + KETOCONAZOL 400 mg



Vaxiduo[®] ÓVULOS

CLINDAMICINA 100 mg + KETOCONAZOL 400 mg

Vaxiduo[®] óvulos
CLINDAMICINA 100 mg + KETOCONAZOL 400 mg

5 CÁPSULAS BLANDAS VAGINALES



Vaxiduo óvulos
CLINDAMICINA + KETOCONAZOL



Vaxiduo.® ÓVULOS

CLINDAMICINA 100 mg + KETOCONAZOL 400 mg

Vaxiduo.® óvulos
CLINDAMICINA + KETOCONAZOL

7 CÁPSULAS BLANDAS VAGINALES







Distribuido por Pharmat S.A.
Bogotá - Colombia
Pharmat S.A. Benavente - Colombia
Línea Soluciones Térmicas Vision Care
Director Técnico
Dr. Roberto Salazar Ojeda S.P.A. de C.
Registo Sanitario No.
000001200-0-200607 Colombia
Registo Sanitario No.
00-4299-0 Guatemala
El Salvador inscrito en la DGEF
Código de No. 00452400001
Perú

Importado por UNIMED DEL PERU S.A.
Calle Los Libertadores 100, piso 6 y 7
San Isidro, Lima - Perú, R.L.C. 2005270899
Director Técnico: L.A. Rosales Reyes
Registo Sanitario No.: Perú
Ecuador
Importado y distribuido por ACCORDIVE
FARMACÉUTICA S.A. (Quito-Ecuador)
Registo Sanitario No.: Ecuador
Producto de uso exclusivo. Administrar bajo
prescripción y vigilancia médica.

USAR BASADO EN RECETA MÉDICA.
MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS.

ALMACENAR A TEMPERATURA INFERIOR A
30 °C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.
UNA VEZ ABIERTO DE CONSERVAR DURANTE
30 DÍAS A TEMPERATURA INFERIOR A 30 °C.
EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.



3 mL

SOLUCIÓN
OFTÁLMICA

PROCAPS
Alap[®] 0,2%
OLOPATADINA



6 mL

SOLUCIÓN
OFTÁLMICA

PROCAPS
Alap[®] 0,2%
OLOPATADINA

Indicaciones:
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica estacional y perenne.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica crónica.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica vernal.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica atópica.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica idiopática.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa desconocida.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa traumática.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa química.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa infecciosa.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa parasitaria.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa tóxica.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa iatrogénica.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa sistémica.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa mixta.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa multifactorial.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa idiopática.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa desconocida.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa traumática.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa química.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa infecciosa.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa parasitaria.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa tóxica.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa iatrogénica.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa sistémica.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa mixta.
- Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica de causa multifactorial.

Contraindicaciones:
- Hipersensibilidad a la olopatadina o a cualquiera de los componentes de la solución.
- Embarazo y lactancia.
- Niños menores de 6 años.





5 mL

SOLUCIÓN
OFTÁLMICA

Brimodor®

DORZOLAMIDA 20 mg + TIMOLOL 5 mg + BRIMONIDINA 2 mg



Epacor



PROCAPS
Epacor[®]
465 mg de Ácido Eicosapentaenoico
375 mg de Ácido Docosahexaenoico

30 Cápsulas

de primera banda constrictiva patentada

Epacor[®] PROCAPS
465 mg de Ácido Eicosapentaenoico
375 mg de Ácido Docosahexaenoico

Nueva
imagen

30
Cápsulas blandas
de goma con forma de
doble corazón

Fenovas®

Rosuvastatina 10 mg +
Ácido Fenofibrico 135 mg

10 mg

PROCAPS

Fenovas®
10 mg

Rosuvastatina 10 mg +
Ácido Fenofibrico 135 mg

Nueva
imagen

30

Cápsulas Banderas
de gelatina con forma de
bandera

Fenovas®

Rosuvastatina 20 mg +
Ácido Fenofibrato 135 mg

20 mg

Fenovas®
Rosuvastatina 20 mg +
Ácido Fenofibrato 135 mg
20 mg

PROCAPS
ITALIA

comprimidos, cada uno, 50 mg
de latanoprost.

INDICACIONES:

Glaucoma de ángulo abierto. Presión intraocular elevada.

CONTRAINDICACIONES:

Presión intraocular elevada.

EFECTOS ADVERSOS:

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

Presión intraocular elevada.

5 mL

SOLUCIÓN
OFTÁLMICA

PROCAPS
Latanox
LATANOPROST 50 mg/mL





Solución oral

FRASCO
x 60 mL



INDICACIONES: ojo seco, ojo irritado, ojo rojizo.
Carboximetilcelulosa sódica 5 mg/ml.
Indicaciones: ojo seco, ojo irritado, ojo rojizo. Se debe utilizar después de cada lavado de ojos. Evitar el uso prolongado. Evitar el uso prolongado. Evitar el uso prolongado. Evitar el uso prolongado.

USO Y PRECAUCIONES:

Consejo: Evitar el uso prolongado. Evitar el uso prolongado. Evitar el uso prolongado. Evitar el uso prolongado.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular.

EFECTOS SECUNDARIOS: No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular.

PRECAUCIONES: No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular.

EFECTOS SECUNDARIOS: No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular.

PRECAUCIONES: No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular.

EFECTOS SECUNDARIOS: No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular.

PRECAUCIONES: No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular.

EFECTOS SECUNDARIOS: No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular.

PRECAUCIONES: No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular.

EFECTOS SECUNDARIOS: No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular. No utilizar en caso de infección ocular.

15 mL

SOLUCIÓN
OFTÁLMICA

PROCAPS
Tearsoft®
CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA 5 mg/ml

CONTRAFARMACÉUTICOS 2000 y otros
Tearsoft®

COMPOSICIÓN cada mL contiene:
Tobramicina 3,00 mg
Dexametasona 0,30 mg

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

En un frasco de 6 mL.

6 mL

SUSPENSIÓN
OFTÁLMICA

PROCAPS
Tobracort 0,3%
TOBRAMICINA 3 mg + DEXAMETASONA 1 mg





14
Cápsulas Blandas

Varteral[®] NF
Valeriatin 160 mg +
Amlodipino 5 mg **160/5 mg**

PROCAPS

Varteral[®]
160/5 mg



14
Cápsulas Blandas

Varteral[®] NF
Valeriatin 160 mg +
Amlodipino 5 mg **160/5 mg**


PROCAPS

Varteral[®]
160/5 mg



14
Cápsulas Blandas

Varteral[®] NF
Valsartán 80 mg +
Amlodipino 5 mg
80/5 mg



Varteral[®]
80/5 mg

Nuevo
análogo

30
Tabletas
Recubiertas

Varteral HCT[®] NF

Valsartán 160 mg + Amlodipino 10 mg +
Hidroclorotiazida 12,5 mg

G-tabs[®]

160/10/12,5 mg

PROCAPS[®]

Varteral HCT[®]
160/10/12,5 mg

Nuevo
imagen

30
Tabletas
Recubiertas

Varteral HCT[®] NF

160/5/12,5 mg

Valartín 160 mg + Amlodipino 5 mg +
Hidroclorotiazida 12,5 mg

G-tabs[®]

GRUPO
PROCAPS

Varteral HCT[®]
160/5/12,5 mg



14
Cápsulas Blandas

Varteral[®] NF
Vilartín 160 mg +
Amlodipino 10 mg **160/10 mg**

PROCAPS 

Varteral[®]
160/10 mg

28

Cápsulas Blandas

Varteral[®] NF
Valsartán 320 mg +
Amlodipino 10 mg **320/10 mg**

PROCAPS

28

Cápsulas Blandas

Varteral[®] NF
Valsartán 320 mg +
Amlodipino 5 mg **320/5 mg**

PROCIUS



Vigia. 100 mg

MODAFINIL 100 mg

10 CÁPSULAS
BLANDAS





Vigia. 100 mg

MODAFINIL 100 mg

3 CÁPSULAS
BLANDAS





Vigia® 200 mg

MODAFINIL 200 mg

14 CÁPSULAS
BLANDAS



Vigia. 200 mg

ta DOAFINIL 200 mg

3 CÁPSULAS
BLANDAS



Nueva
Imagen

Contiene Omega-3, el cual disminuye la probabilidad de
tener degeneración macular relacionada a la edad.

60 CÁPSULAS BLANDAS DE
GELATINA CON
CUBIERTA ENTÉRICA

Visomega®

ÁCIDOS GRASOS POLINSATURADOS OMEGA 3 AL 84% + VITAMINA C
+ VITAMINA E + ZINC + COBRE + LUTEINA + ZEAXANTINA

